


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ



ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Гам-КОВИД-Вак**

**Комбинированная векторная вакцина для профилактики  
коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2**

торговое наименование лекарственного препарата

**раствор для внутримышечного введения,  
компонент I – 0,5 мл/доза + компонент II – 0,5 мл/доза**

лекарственная форма, дозировка

**Филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Россия /  
АО «Биннофарм», Россия / АО «ГЕНЕРИУМ», Россия / ЗАО «БИОКАД», Россия /  
ЗАО «ЛЕККО», Россия / ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия /  
АО «Р-Фарм», Россия / ООО «СПУТНИК ТЕХНОПОЛИС» (компонент II), Россия**

наименование производителя, страна

Изменение № 1


211021

Дата внесения Изменения «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Взаимодействие с другими лекарственными средствами</b> Не изучалось. Ввиду отсутствия данных исследований совместимости, вакцину Гам-КОВИД-Вак (Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2) нельзя смешивать с другими вакцинами или иными лекарственными средствами в одном шприце.</p>	<p><b>Взаимодействие с другими лекарственными средствами</b> Специальных исследований лекарственных взаимодействий не проводилось. Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины Гам-КОВИД-Вак (Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2), так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении. Ожидается отсутствие снижения иммуногенности для расщепленных, субъединичных и полимерсубъединичных гриппозных вакцин. Не допускается смешивание вакцины Гам-КОВИД-Вак с другими вакцинами или иными лекарственными средствами в одном шприце, так как нет данных о фармацевтическом взаимодействии.</p>
<p><b>Особые указания</b> У пациентов, получающих</p>	<p><b>Особые указания</b> У пациентов, получающих</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение, как минимум, 1 месяца до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности. Подобно остальным вакцинам, защитный иммунный ответ может возникать не у всех вакцинируемых лиц.</p>	<p>иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение, как минимум, 1 месяца до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности. Подобно остальным вакцинам, защитный иммунный ответ может возникать не у всех вакцинируемых лиц. При принятии врачом (медицинским работником) решения о необходимости одновременного введения Гам-КОВИД-Вак с другой вакциной, не допускается их смешивание в одном шприце и введение в один участок тела.</p>

Директор  
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»  
Минздрава России



А.Л. Гинцбург

«26» октября 2021 г.

ФГБУ "НИЦЭМ ИМ.  
Н.Ф. ГАМАЛЕИ"  
МИНЗДРАВА РОССИИ

Подписано цифровым способом: ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. ГАМАЛЕИ, МИНЗДРАВА РОССИИ  
DN: email=administrator@gamaleia.org, title=ДИРЕКТОР,  
1.2.840.1135481.1.2.2=ИИН-7734013214009-773401001/  
OGN=102773944355,  
1.2.645.100.3=120830304342332323237917,  
1.2.645.100.1=10002130323732304343333335,  
1.2.645.3.13.1.1=12083030373233430313323134, street=УЛИЦА  
ГАМАЛЕИ, ДОМ 18, район=АЛЕКСАНДР ЛЕОНОВСКИЙ,  
им=ГИНЦБУРГ, sn=АЛЕКСАНДР, o=ФГБУ НИЦЭМ  
ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ, МИНЗДРАВА РОССИИ, ou=ФГБУ  
НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ, МИНЗДРАВА РОССИИ